

<p>Alternative pilule lendemain</p> <p>Использование alternative pilule lendemain необходимо, если с момента незащищенного полового акта прошло более 3-х дней и наступила беременность. Лекарственные препараты следует использовать для прерывания нежелательной беременности.</p> <p>Pilule lendemain или метод экстренной контрацепции позволяет избежать нежелательной беременности. Средства для контроля рождаемости могут понадобиться если:</p> <ul style="list-style-type: none"> • половой акт не был защищенным; • произошел разрыв или сползание презерватива; • женщина пропустила прием противозачаточного средства; • после незащищенного полового акта прошло не более 3-х дней. <p>Если после половой активности прошло более 72-х часов, экстренная контрацепция будет неэффективна. Необходимо купить alternative pilule lendemain, чтобы использовать их для прерывания беременности.</p> <p>Действие препаратов для экстренной контрацепции отличается от контрацептивов. Средства для контроля рождаемости не предотвращают зачатие и наступление беременности. Лекарственные препараты не позволяют яйцеклетке присоединиться к стенке матки. Даже если оплодотворение произошло, развитие эмбриона невозможно.</p> <p>Одним из препаратов для контроля рождаемости является Lévonorgestrel. Гормональный препарат необходимо принять как можно скорее после незащищенного полового акта. Спустя 3 дня после половой активности использование гормонального препарата будет бесполезным.</p>	<p>Alternative de la pilule du lendemain</p> <p>L'utilisation de l'alternative de la pilule du lendemain est indispensable si un rapport sexuel non protégé a eu lieu il y a plus de 72 heures et la grossesse est survenue. Les médicaments doivent être utilisés pour interrompre une grossesse non désirée.</p> <p>La pilule du lendemain ou la contraception d'urgence permet d'éviter la grossesse non désirée. Les moyens de contrôle des naissances doivent être utilisés en cas de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un rapport sexuel non protégé; • un problème avec un préservatif (mal mis ou déchiré) • un oubli de la pilule de contraception régulière; • au plus tard, 72 heures (trois jours) après le rapport sexuel non protégé. <p>Passé les 72 premières heures après le rapport sexuel non protégé, la contraception d'urgence est inefficace. Il faudra acheter l'alternative de la pilule du lendemain pour interrompre une grossesse non désirée.</p> <p>L'action de la contraception d'urgence diffère de celle des contraceptifs. Les moyens de contrôle des naissances n'empêchent pas la survenue de la grossesse. Les médicaments ne permettent pas à un ovule de se fixer à la paroi utérine. Même si la fécondation a eu lieu, le développement de l'embryon est impossible.</p> <p>Un des médicaments pour le contrôle des naissances est le Lévonorgestrel. Le médicament hormonal doit être pris le plus tôt possible après le rapport non protégé. Passé les 72 premières heures (3 jours), l'usage du médicament hormonal n'est plus efficace.</p>
---	--

<p>Если после незащищенного полового акта прошло более 72-х часов, можно использовать <i>alternative pilule lendemain</i> – лекарственный препарат Ulipristal. Принцип его действия тот же, что и у Lévonorgestrel – торможение процесса овуляции, то есть выхода яйцеклетки из яичников.</p> <p>Но преимуществом Ulipristal является то, что лекарственный препарат можно принимать в течение 5-ти дней после незащищенного полового акта. Таким образом, Ulipristal существенно расширяет диапазон для экстренной контрацепции.</p> <p>Но что делать, если после половой активности прошло более 5-ти дней и осуществилось оплодотворение? <i>Alternative pilule lendemain</i> может стать лекарственный препарат Mifépristone, который служит для предотвращения, а для прерывания беременности.</p> <p>Лекарственный препарат представляет собой синтетический стероидный антигестаген, то есть антагонист половых гормонов. Лекарственный препарат подавляет активность прогестерона – гормона, необходимого для нормального течения беременности. С целью осуществления медикаментозного аборта следует принять 600 mg Mifépristone.</p> <p>Чем больше срок беременности, тем выше уровень прогестерона в организме женщины. Поэтому эффективность антигестагена повышается на ранних сроках беременности, когда организм женщины содержит небольшие концентрации прогестерона.</p> <p>В зависимости от срока беременности, использование <i>alternative pilule lendemain</i> следует комбинировать с другими лекарственными препаратами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с 1-го по 49-ый день – с аналогами Prostaglandine; 	<p>Si le délai de 72 heures dépassé, la contraception d'urgence par Ulipristal, l'alternative de la pilule du lendemain, reste possible. Son mode d'action est le même que celui du Lévonorgestrel, il bloque ou tarde l'ovulation, c'est-à-dire, la libération d'un ovocyte par l'ovaire.</p> <p>Mais l'avantage de l'Ulipristal est que le médicament peut être pris dans les 5 jours après un rapport sexuel non protégé. Ainsi, l'Ulipristal élargit considérablement les possibilités de la contraception d'urgence.</p> <p>Mais que faire si le délai de 5 jours est dépassé et la fécondation s'est produite? Alors, la Mifépristone en tant que l'alternative de la pilule du lendemain peut être utilisée pour interrompre la grossesse.</p> <p>Ce médicament est un stéroïde synthétique à l'action anti-progestative, c'est-à-dire, l'antagoniste de la progestérone. Le médicament inhibe l'action de la progestérone, l'hormone assurant le maintien de la grossesse. La Mifépristone est prise en une seule dose de 600 mg pour l'inter interruption médicamenteuse de grossesse.</p> <p>Le taux de progestérone se multiplie en fonction du stade de la grossesse. Par conséquent, l'efficacité de l'anti-progestatif est maximale au début de la grossesse, lorsque l'organisme de la femme contient une faible concentration de progestérone.</p> <p>En fonction de la durée de la grossesse, l'alternative de la pilule du lendemain doit être combinée avec d'autres médicaments :</p> <ul style="list-style-type: none"> • jusqu'à 49 jours d'aménorrhée: avec les analogues de la Prostaglandine;
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • с 50-го по 63 день – с Géméprost. <p>Аналоги Prostaglandine способствуют созреванию шейки матки и облегчают выход эмбриона. Géméprost применяется в клинической практике при подготовке к аборту. Оба препарата используются спустя 1,5-2 суток после приема антигестагена.</p> <p>После применения alternative pilule lendemain женщина может испытывать неблагоприятные реакции. Такие побочные эффекты как головная боль, потливость или диарея не являются клинически значимыми и возникают в ответ на действие антигестагена.</p> <p>Вероятность медикаментозного аборта с применением антагониста половых гормонов составляет 95%. Если беременность сохранилась спустя 2 недели после приема Mifépristone, женщине следует применить другие способы для прерывания беременности.</p> <p>Антигестаген представляет собой безопасную alternative pilule lendemain и является более доступным методом прерывания беременности по сравнению с хирургическим абортом.</p> <p>Использование Mifépristone не требует применения наркоза, длительного пребывания в стационаре или других медицинских процедур, необходимых для хирургического аборта. Но женщина должна регулярно посещать консультации лечащего врача.</p> <p>Преимущества использования Mifépristone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • абортивный эффект не является дозозависимым; • можно использовать как для экстренной контрацепции, так и 	<ul style="list-style-type: none"> • de 50 à 63 jours d'aménorrhée : avec le Géméprost. <p>Les analogues de la Prostaglandine contribuent au ramollissement et à la dilatation du col utérin et facilitent l'évacuation de l'embryon. Le Géméprost est utilisé dans la pratique clinique en préparation à l'interruption chirurgicale de grossesse. Les deux médicaments doivent être pris 36 à 48 heures plus tard de l'administration de l'anti-progestatif.</p> <p>L'usage de l'alternative de la pilule du lendemain peut provoquer des effets indésirables. Les effets secondaires tels que les maux de tête, la transpiration ou la diarrhée ne sont pas cliniquement significatifs et se produisent en réponse à l'action de l'anti-progestatif.</p> <p>Le taux de succès de l'interruption médicamenteuse de grossesse à l'aide de l'antagoniste de la progestérone atteint 95 %. Si la grossesse n'est pas interrompue dans les deux semaines après la prise de la Mifépristone, il est nécessaire d'utiliser d'autres méthodes pour l'interruption de la grossesse.</p> <p>L'anti-progestatif est une alternative sans risque de la pilule du lendemain qui est plus abordable que l'interruption chirurgicale de grossesse.</p> <p>L'utilisation de la Mifépristone ne nécessite pas d'anesthésie, de long séjour à l'hôpital ou d'autres procédures médicales nécessaires pour l'interruption chirurgicale de grossesse. Pourtant, la femme doit consulter régulièrement son médecin.</p> <p>Les avantages de la Mifépristone :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'absence d'effet dose-dépendant lors de l'utilisation de la Mifépristone; • elle peut être utilisée pour la contraception d'urgence et comme
--	---

<p>в качестве alternative pilule lendemain;</p> <ul style="list-style-type: none">• возможность использования на ранних сроках беременности, когда хирургический аборт недоступен. <p>Медикаментозный аборт с применением антигестаген не влияет на репродуктивные функции женщины. Беременность может произойти в первом менструальном цикле после медикаментозного аборта.</p> <p>Несмотря на то, что антигестаген является одним из самых эффективных методов прерывания беременности, Mifépristone не рекомендуется использовать в качестве регулярной alternative pilule lendemain. Частое применение антигестагена может вызвать побочные эффекты, самым распространенным из которых является нарушение менструального цикла.</p>	<p>l'alternative de la pilule du lendemain ;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'utilisation au début de la grossesse quand l'interruption chirurgicale de grossesse n'est pas accessible. <p>L'interruption médicamenteuse de grossesse à l'aide d'un anti-progestatif n'affecte pas la fonction reproductive de la femme. La grossesse peut survenir au cours du premier cycle menstruel suivant l'interruption médicamenteuse de grossesse.</p> <p>Bien que l'usage de l'anti-progestatif est une des méthodes les plus efficaces de l'interruption médicamenteuse de grossesse, il est déconseillé d'utiliser la Mifépristone comme l'alternative de la pilule du lendemain de façon régulière. L'utilisation fréquente de l'anti-progestatif peut provoquer des effets secondaires, notamment, des troubles menstruels.</p>
---	--